



## General Care **4 in 1**

**Canker, Paratyphus, E-coli und bakterielle Infektionen**

### Symptome

Gewichtverlust und Allgemeinzustand, die Stühle sind grün und fettig, die Gelenke der Füße und der Flügel sind geschwollen, die Eier sind nicht fruchtbar, manchmal biegen sie den Hals zur Seite, Erkranken bei jungen Vögeln, plötzlicher Tod.

#### Dosierung

#### 100 g PULVER

**Vorbeugend:** 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen. Empfohlen wird nach dem Wettbewerbstag zu beginnen.

**Heilung:** 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser im Laufe von 5-7 Tagen.  
Wenn nötig kann dieses Arzneimittel nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

**Zusammensetzung:** Furaltadone HCl 12%, Metronidazole 20%, Chlortetracycline HCl 10%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

#### Dosierung

#### 50 TABLETTE

**Vorbeugend:** 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

**Heilung:** 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) ) im Laufe von 3-5 aufeinanderfolgenden Tagen oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

**Zusammensetzung:** Furaltadone HCl 75 mg/g ; Ronidazole 25 mg/g